

Protocole de recueil des selles

Dans le cas d'examen parasitologique des selles, 48h avant le recueil, privilégier une alimentation pauvre en fibres : éviter les légumes (secs, verts, choux), les fruits (tomates, pêches, abricots, fraises, figues) et le pain complet. Éviter également la prise de laxatif.

- Recueillir les selles de préférence le matin dès émission dans un récipient propre ; puis à l'aide de la spatule (contenue dans le kit du laboratoire), mettre l'équivalent de deux « grosses noix » dans le flacon stérile. Recueillir d'éventuels éléments glaireux, sanglants ou d'aspect atypique.
- Revisser soigneusement le flacon.
- Identifier le flacon avec votre nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d'usage (nom marital), date de naissance et sexe, si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Noter l'heure de recueil sur le flacon et remplir cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques,
- Transmettre au laboratoire le flacon accompagné de l'ordonnance et de cette fiche de suivi médical complétée.

Pour une prescription de Coproculture, Bactériologie (Clostridium difficile, ...), Virologie (Adénovirus, Norovirus et Rotavirus) ou de Recherche de sang dans les selles, le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante). Sinon, le flacon doit être conservé au réfrigérateur (2-8°C) et acheminé sous 24 h maximum.

Pour une prescription de Parasitologie, le flacon doit être conservé à température ambiante et acheminé au laboratoire dans un délai maximum de 8 h après le recueil (sauf si recherche d'amibes : acheminement dans les 2 h). Pas de conservation au froid.

Dans le cas d'une prescription pour Coproculture et Parasitologie, le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante). S'il n'est pas possible de respecter ce délai, apporter 2 flacons selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Protocole de recueil d'expectoration (crachat)

- Le recueil de l'expectoration doit être effectué avant tout traitement antibiotique (ou après arrêt d'au moins 48h).
- L'expectoration doit être émise le matin au lever, à jeun, au cours d'un effort de toux après rinçage de la bouche avec de l'eau ou mieux lors de séance de kiné respiratoire.
- Recueillir dans le pot stérile l'expectoration générée.
- Il faut éviter au maximum de recueillir de la salive. Celle-ci masque en effet la flore pathogène et génère des difficultés d'interprétation des résultats.
- Identifier le flacon avec votre nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d'usage (nom marital), date de naissance et sexe, si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Noter l'heure de recueil sur le flacon et remplir cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques,
- Transmettre au laboratoire le flacon accompagné de l'ordonnance et de cette fiche de suivi médical complétée.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante).

Sinon, le flacon doit être conservé au réfrigérateur (2-8°C) et acheminé sous 24 h maximum.