



**POUR LES PATIENTS MINEURS :** Le laboratoire considère que le recueil est réalisé avec accord préalable du parent ou du représentant légal.

### PROTOCOLE DE RECUEIL DE LA SALIVE :

Le recueil de salive ne doit pas être effectué après un effort de toux, il doit être uniquement composé de salive. **A jeun ou sans avoir mangé, ni bu, ni fumé depuis 30 minutes.**

- **Se laver les mains,**
- Enlever le bouchon **Ne pas enlever le liquide présent dans le tube,**
- Visser l'entonnoir bleu sur le tube,
- Procéder au recueil de salive :
  - Fermer la bouche,
  - Remuer la langue pendant 20 secondes,
  - Déposer la salive dans le tube, jusqu'à la graduation 2 (2 ml),
- Dévisser le support bleu et le jeter,
- Refermer le tube avec le bouchon orange,
- Désinfecter l'extérieur du flacon avec la lingette,
- **Se laver à nouveau les mains,**



Niveau de remplissage à respecter  
**(Recommencer si besoin pour avoir suffisamment de salive dans le tube)**

- **Identifier le tube avec le nom de naissance, prénom, nom d'usage, date de naissance et sexe du patient.**
- Placer le tube dans le sachet vert et le fermer hermétiquement à l'aide de la languette autocollante,
- Placer dans la pochette externe cette fiche de suivi médical complétée avec l'ordonnance,
- Puis placer le tout dans le sachet zippé.



Transmettre l'échantillon au laboratoire dans les plus brefs délais (< 6h)  
à température ambiante.